

Fragen nur sinngemäß, ohne Gewähr

- Nennen Sie 2 Dimensionen von Achtsamkeit
- Was sind die Phasen der Therapieentwicklung?
- Nennen Sie 4 Bereiche aus dem Forschungshintergrund der ITP
- Nennen Sie 4 potenzielle Wirksamkeiten von achtsamkeitsbasierten Ansätzen
- Nenne 4 Fertigkeiten
- Was ist beim allgemeinen Problemlösemodell (D´Zerillo ?) NICHT dabei?
 - ⇒ Bewertung von Zielen
- Schritte/Reihenfolge im Maßregelvollzug
- Was gehört NICHT zu psychodynamischen Techniken?
 - ⇒ Ressourcenorientierung
- Fallbeispiel: Patientin hat das Gefühl, wenn sie eine Frage nicht richtig beantwortet, mag der Therapeut sie nicht mehr
 - ⇒ Übertragungshypothese
- Schematherapie □ Gehört nicht zu den well-established-treatments (APA)
- Unterschiede zwischen MBCT (Mindfulness-based...) und KT
- Verbinde Therapien mit Anwendungsgebieten:
 - ⇒ DBT: Borderline
 - ⇒ CBASP: Depression
 - ⇒ ...
- Fallbeispiel nach dem Nürnberger Kodex bewerten
- Zu welcher Validität gehört Dropout und Teilnehmerauswahl?
- Was ist am wenigsten hilfreich bei Studien für Verbesserung der Schlussfolgerungvalidität (Fallbeispiel)?
- Welche Parameter werden nicht bei Neurofeedback gemessen?
- Welche Zielparameter und Indikatoren bei Biofeedback (4) ?
- Nach EST anerkannte 3 Bereiche der 8 wichtigen Bereiche für GT
- Therapiebeziehung □ wichtige Merkmale
 - ⇒ Zielübereinstimmung und Kooperation
- Typischer Gedanke für Typ-II-Kognitionen
- Fallbeispiel Schokoladenpraline und Essstörung □ Cue Exposure
- Studie über Vergleich KVT und ITP kennen
- Was ist richtig? □ ITP nicht nur für Depressionen
- Sozialrechtliche Anerkennung kennen
- KVT Annahmen bei Schizophrenie
- Prinzip von Progressiver Muskelentspannung
- Was ist alles richtig bei RCTs? □ hohe externe Validität
- Verfahren von Beck nennen (Skalentechnik, Tortentechnik, Kotzen-Nutzen-Analyse, ...)